


# **Vespa Velutina** (asiática)





NINHO PRIMÁRIO



NINHO DEFINITIVO



## **A VESPA VELUTINA**

### **CICLO ANUAL**

Também conhecida por vespa asiática, é uma espécie anual, que surge no início da primavera, com pequenos ninhos em locais abrigados (alpendres, arrecadações, etc.) apenas com a rainha.

A população vai aumentando e, com ela, o tamanho dos ninhos, até construírem ninhos definitivos, normalmente em árvores.

Nos meses de verão, as colónias têm centenas de vespas, sendo frequente os avistamentos de vespas (obreiras) e os ataques a colmeias.

No outono as futuras rainhas são fecundadas e procuram abrigos para hibernarem.

No inverno a rainha morre e, deixando de haver novos nascimentos, a colónia vai enfraquecendo com a morte das obreiras até deixar de haver população.

Esta espécie não é, individualmente, mais agressiva, mas reage em grupo se o ninho for perturbado.

O seu veneno não é mais ativo do que o das outras espécies de vespas.

É perigoso se a pessoa for alérgica ou em caso de múltiplas picadas.

## IDENTIFICAÇÃO DE NINHOS


Ninhos esféricos feitos em celulose (parecem cartão) entre 5 centímetros, na primavera, a 80 centímetros no outono, podendo estar em alpendres, árvores ou escondidos em cavidades.



**5 cm**

NA PRIMAVERA

NINHO PRIMÁRIO



**80 cm**

NO OUTONO

NINHO DEFINITIVO

## POSSÍVEIS LOCALIZAÇÕES

Alpendres

Telhados

Árvores

Pequenas cavidades

## **COMO REPORTAR**

Estando todo o distrito de Lisboa já colonizado, são comuns os avistamentos.

É importante a comunicação dos ninhos para a sua destruição.

Os ninhos devem ser reportados preferencialmente para:

**stopvespa.icnf.pt**

Caso não seja possível, poderá contactar a Câmara Municipal de Loures:

**dspa@cm-loures.pt**

## **ATUAÇÃO MUNICIPAL**

Durante a primavera, a Câmara Municipal de Loures coloca armadilhas em locais estratégicos, para capturar precocemente as rainhas.

Ao longo do ano, efetua igualmente a destruição dos ninhos reportados pela população.